



入院診療計画書 (化学療法を受けられる方へ)

入院日：平成 年 月 日 お名前()様 病名()

項目	治療前日	化学療法 1日目	化学療法 2日目	化学療法 3日目	化学療法 4日目	化学療法 5日目	化学療法 6日目	
達成目標	検査結果に異常がない 白血球数の減少がない	副作用が最小限に抑えられる 吐き気が少なく、食事が摂れる 不安を言葉に表出できる	副作用が最小限に抑えられる 吐き気が少なく、食事が摂れる 不安を言葉に表出できる	副作用が最小限に抑えられる 吐き気が少なく、食事が摂れる 不安を言葉に表出できる	副作用が最小限に抑えられる 吐き気が少なく、食事が摂れる 不安を言葉に表出できる	副作用が最小限に抑えられる 吐き気が少なく、食事が摂れる 不安を言葉に表出できる	副作用が最小限に抑えられる 吐き気が少なく、食事が摂れる 不安を言葉に表出できる	[退院基準] 副作用が少ない 採血の結果異常がない 吐き気が軽く、食事が摂れる
治療	19時 点滴開始 	24時間の持続点滴 9時 抗癌剤開始 イホマイド ラステッド パラプラチン ウロミテキサン カイトリル ランダ アドリアマイシン	24時間の持続点滴 9時 抗癌剤開始 イホマイド ラステッド パラプラチン ウロミテキサン カイトリル ランダ アドリアマイシン	24時間の持続点滴 9時 抗癌剤開始 イホマイド ラステッド ウロミテキサン カイトリル	24時間の持続点滴 9時 抗癌剤開始 イホマイド ラステッド ウロミテキサン カイトリル	24時間の持続点滴 9時 抗癌剤開始 イホマイド ラステッド ウロミテキサン カイトリル	24時間の持続点滴 9時 抗癌剤開始 イホマイド ラステッド ウロミテキサン カイトリル 	
処置	点滴の針を入れます						点滴の針を抜きます	
検査	採血・検尿 身長・体重の測定 体温、血圧測定	1日4回 体温・血圧を測定します (状態により追加測定します)					採血 1日3回体温・血圧を測定します	
活動	病院内は制限ありません	吐き気や倦怠感がなければ、病棟内は自由です					吐き気や倦怠感がなければ 病院内は自由です	
食事	普通食です	普通食です 食欲のない時は無理に食べる必要はありません(さわやか食もあります)						
清潔	入浴・シャワーができます	体を拭くか、シャワーができます					入浴・シャワーができます	
排泄		尿量を測定します 排尿ごとに尿潜血を調べます						
説明	尿量や尿潜血の測定方法 と記入の仕方について説明 します 入院治療説明	1日の点滴の数は決まっていますが、尿量が少ない場合には追加があります 吐き気止めは点滴の中に入っていますが、それでも吐き気が強いときは注射がありますので、申し出てください					採血の結果がよければ、退院で きます 退院説明 次回受診予約	

平成 年 月 日 主治医() 受け持ち看護師()

注1 病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査を進めていくにしたがって変わり得るものである。

注2 入院期間については現時点で予想されるものである。